

(2564, เมษายน), ผู้ที่มีโรคประจำตัวกับการเตรียมตัวฉีดวัคซีน : ชีวจิต. 23 (540) : 9

ผู้ที่มีโรคประจำตัวกับการเตรียมตัวฉีดวัคซีน

ศาสตราจารย์นายแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ความรู้ในการเตรียมตัวฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกรณีที่มีโรคประจำตัว ดังนี้

- ผู้ที่มีใช้สูงเกิน 38 ปวดเมื่อยมาก อ่อนเพลียมาก ควรทานยาพาราเซตามอล 1 เม็ด แต่ให้หลีกเลี่ยงยาแก้ปวดชนิดแรง เช่น ยาแอสไพริน ซึ่งอาจไปกดระบบตอบสนองของร่างกาย ทำให้วัคซีนตอบสนองได้น้อยลง
- ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว หากทานยา ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนฉีดวัคซีน
- ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ อัมพฤกษ์และอัมพาต ไม่ควรหยุดยาเพื่อฉีดวัคซีน ยกเว้นแพทย์แนะนำให้หยุดยา เพื่อให้ผลลัพธ์ของวัคซีนมีความแม่นยำ
- ผู้ที่เป็นโรคเลือดออกได้ง่าย ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนการฉีดวัคซีน เพราะอาจต้องใช้เวลากดแผล บริเวณที่ฉีดให้นานขึ้น เช่น จาก 5 นาที เป็น 15 นาที หากหลังการฉีดวัคซีนมีอาการห้อเลือดหรือจ้ำเลือด ควรรีบพบแพทย์
- ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว หากมีอาการของโรคกำเริบ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนหรือไม่ก็ตาม ควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที

