

ศิริกร โปธิจักร. (2565, เมษายน), 4 ชั้นตอน แนวทางทำโฮมไอโซเลชันให้เด็ก : ชีวิต : 24 (565) : 10

นายแพทย์อดิศัย ภัตตาดั่ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ระบุว่า จากสถิติที่ผ่านมาพบว่าเด็กที่ติดโควิด-19 ช่วงอายุ 3-11 ปี เป็นกลุ่มที่พบบ่อยที่สุด สำหรับกลุ่มที่มีอาการรุนแรงมักจะเป็นกลุ่มที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคสมอง หัวใจ มะเร็ง หรือกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง โดยแนวทางการทำโฮมไอโซเลชันให้เด็ก มีดังนี้

1. กรณีเด็กที่ทำโฮมไอโซเลชันได้ ต้องมีไข้ไม่สูง ไม่มีโรคประจำตัวรุนแรง ไม่ซึม กินอาหารได้ มีผู้ดูแล และมีห้องน้ำแยกเพื่อป้องกันการกระจายของเชื้อ
2. ติดต่อลงทะเบียนในระบบ สปสช. มี 3 วิธี ได้แก่
 - วิธีที่ 1 โทรศัพท์สายด่วน 1330 กด 14
 - วิธีที่ 2 แอดไลน์ออฟฟิเชียล สปสช. @nhso
 - วิธีที่ 3 คลิกที่ลิงค์ <https://crmsup.nhso.go.th/#TicketHI>
3. เมื่อเข้าระบบแล้วจะมีทีมพยาบาลติดตามอาการอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง มีการส่งเครื่องมือวัดไข้ เครื่องมือวัดออกซิเจน ยา ฤกษ์ขยะติดเชื้อ อาหาร รวมทั้งของเล่นให้เด็ก
4. ในกรณีที่เด็กมีอาการแยกลง เช่น ไข้สูงกว่า 39 องศาเซลเซียสขึ้นไปภายใน 24 ชั่วโมง ซึม ไม่กินอาหาร หายใจเร็ว มีระดับออกซิเจนที่ปลายนิ้วต่ำกว่าร้อยละ 96ต้องรีบนำส่งแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านโดยด่วน

